붙임2 품목별 허가사항 통일조정

■(주)국보싸이언스

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	케이비가드(Guard)(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1) 15～20cm 거리를 두고 팔, 다리, 목 등 노출부위에 분무한다. 2) 양말 또는 의류에도 같은 방법으로 분무한다. 3) 얼굴에 적용 시는 손바닥에 분무하여 발라준다	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 금기 ·유아에게는 사용을 금할 것. 2. 부작용 ·피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생 할 수 있다. ·눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있다. 3. 적용상의 주의 ·신속히 흡수 될 수 있는 피부 부위(큰 상처, 관절 부위, 점막, 눈 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 말 것. ·노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신 도포는 피하고, 체표면의 20% (대략 양쪽팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 할 것. ·먹었을 때에는 의사에게 즉시 진찰을 받도록 할 것. ·눈에 들어갔을 때에는 물로 충분히 씻은 것. 자극이 계속되면 의사에게 진찰을 받을 것. ·필요이상으로 장시간 적용하지 말 것.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	·실내에 들어오면 적용했던 피부를 비누와 물로 씻을 것. 속옷에 사용하지 말 것. ·열 또는 화염 근처에서 사용하지 말 것. 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 4. 일반적 주의 ·40℃ 이상되는 곳에 보관하지 말 것. ·사용 후 빈용기는 폐기할 것. ·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ·안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 가죽, 플라스틱, 손목시계이 뚜껑, 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에는 본 품의 접촉을 피할 것. ·음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 말 것.	고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기 부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	슈퍼가드마일드에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1l회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라둔다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험 하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그가드액(디에틸톨루아미드)(리모닌향, 피톤키드향, 라벤더향, 자몽향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기기피	(분무형 액제) 모기의 기피
용 법 용 량	적당량을 노출된 피부에 분무한다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사 용 상 의 주 의 사 항	디에칠톨루아미드 단일제 (10%초과 30%이하 에어로졸/스프레이) (Diethyltoluamide) 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	5) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그밀크알파로션(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(로션제) 모기기피	(로션제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	5) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(2시간 이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	무무스가드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1)주의사항 1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출 부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	무무스가드에어로솔(이카리딘)	
효능·효과	(에어로솔제) 털진드기의 기피제	(에어로솔제) 털진드기의 기피
용법·용량	피복에 똑바로 세워 고루 분사한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법, 용량에 따를 것. 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 육아실 및 영유아가 있는 방, 환자나 노인들이 있는 곳에서는 사용하지 말 것. 4. 분사지역에 수족관을 두지 말 것. 5. 직사광선이나 50℃ 이상에 노출시키지 말 것. 6. 인화성이 있으므로 화기 가까이에 두거나 사용하지 말 것. 7. 자동에어로솔 분무장치는 음식물이 노출된 곳, 음식물 조리실 혹은 주방기기에서 3.7미터 이상 떨어져서 사용할 것. 8. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 9. 빈 용기일지라도 구멍을 뚫거나 태우지 말 것. 10. 고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험함으로 다음 사항에 주의하십시오. 1) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 2) 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. 3) 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출 부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 사용하는 경우 손에 먼저 덜어 눈이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	것. 4) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. 5) 불속에 버리지 말 것. 6) 사용 후 잔가스가 없도록 하여 버릴 것. 7) 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.	나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 사용하는 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험 하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)그린썬

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그프리액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 15~20cm 거리를 두고 팔, 다리, 목 등 노출 부위에 분무한다. 2) 양말 또는 의류에도 같은 방법으로 분무한다. 3) 얼굴에 적용 시는 손바닥에 분무하여 발라준다	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 금기 ·유아에게는 사용을 금할 것. 2. 부작용 ·피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생 할 수 있다. ·눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있다. 3. 적용상의 주의 ·신속히 흡수 될 수 있는 피부 부위(큰 상처, 관절 부위, 점막, 눈 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 말 것. ·노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신 도포는 피하고, 체표면의 20% (대략 양쪽팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 할 것. ·먹었을 때에는 의사에게 즉시 진찰을 받도록 할 것. ·눈에 들어갔을 때에는 물로 충분히 씻은 것. 자극이 계속되면 의사에게 진찰을 받을 것. ·필요이상으로 장시간 적용하지 말 것. ·실내에 들어오면 적용했던 피부를 비누와 물로 씻을 것. 속옷에 사용하지 말 것. ·열 또는 화염 근처에서 사용하지 말 것. 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 4. 일반적 주의 ·40℃ 이상되는 곳에 보관하지 말 것. ·사용 후 빈용기는 폐기할 것. ·소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ·안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 가국, 플라스틱, 손목시계이 뚜껑, 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에는 본 품의 접촉	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	을 피할 것. ·음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 말 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)그린월드팜

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	그린팍스액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. (단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안 됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기씨로션(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(로션제) 모기, 쇠파리의 기피	(로션제) 모기 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기젯액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기콘트롤액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것.(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그라인(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그라인겔(이카리딘)	
효능·효과	(겔제) 모기의 기피	(겔제) 모기의 기피
용법·용량	사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부위에 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수 될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)그린제약

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스클리어스트롱에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20CM의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신방, 양말, 의복 등에 분무한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있따. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)녹십자

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	인섹탄액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 약 10～20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분무한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)로얄파마

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키퍼(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	인섹트가드에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1l회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라둔다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버그키퍼(이카리딘)(라벤더향, 쟈스민향, 후레쉬카모마일향, 그린후로랄향, 시트러스향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)벅스존

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스존가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세이상~12세미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만: 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되러 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스존세이프액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3(2). 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수 될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관 할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스존디펜스액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세이상~12세미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만: 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)베스트텍코리아

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	베카키퍼액(디에틸톨루아미드)(무향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	더프트앤도프트안티벅스스프레이(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기,털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기기피제로 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 안 이 첨부문서를 소지 할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 DT다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 ㅊ우분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것.) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)비티글로벌

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	울트라가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	① 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. ② 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. ② 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다 (단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). ④ 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 ① 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. ② 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). ③ 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3) 기타 이 약의 사용시 주의사항 ① 이 약은 외용으로만 사용한다. ② 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. ③ 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. ④ 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. ⑤ 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. ⑥ 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. ⑦ 속옷에는 사용하지 않는다. ⑧ 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. ⑨ 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유 (나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. ⑩ 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. ⑪ 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. ⑫ 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ⑬ 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. ⑭ 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. ⑮ 불 속에 버리지 말 것. ⑯ 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4) 저장상의 주의사항 ① 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. ② 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ③ 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	울트라쉴드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	(분무형 액제) 1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 ① 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. ② 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). ③ 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3) 기타 이 약의 사용시 주의사항 ① 이 약은 외용으로만 사용한다. ② 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. ③ 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. ④ 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. ⑤ 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. ⑥ 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	⑦ 속옷에는 사용하지 않는다. ⑧ 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. ⑨ 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유 (나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. ⑩ 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. ⑪ 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. ⑫ 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ⑬ 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. ⑭ 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. ⑮ 불 속에 버리지 말 것. ⑯ 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4) 저장상의 주의사항 ① 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. ② 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ③ 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)삼현제약

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	삼현모기가드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 잇는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)십자성

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	십자기피액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	① 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. ② 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. ② 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다 (단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). ④ 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 ① 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. ② 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). ③ 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3) 기타 이 약의 사용시 주의사항 ① 이 약은 외용으로만 사용한다. ② 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. ③ 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. ④ 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. ⑤ 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. ⑥ 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. ⑦ 속옷에는 사용하지 않는다. ⑧ 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. ⑨ 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유 (나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. ⑩ 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. ⑪ 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. ⑫ 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ⑬ 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. ⑭ 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. ⑮ 불 속에 버리지 말 것. ⑯ 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4) 저장상의 주의사항 ① 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. ② 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ③ 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	십자이카기피액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)씨아이티

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스케어플러스액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)씨엔지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	라이프가드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	(1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)알앤엘애니멀헬스

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	틱캅스액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것.(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것. 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 접촉했을 경우네는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음) 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에는 어떠한 것도 주어서는 안됨) 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 혓볕에 많이 탄 피부에는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 덜어 바르고, 눈이나 입 주위를 피하고, 귀주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용이게 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)엘팜

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	썸머가드(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인약 10～20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■[주]오송

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	오송리펠라가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면위 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	스킨세이프겔(이카리딘)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부위에 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것	량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	스킨세이프기피제(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무하십시오. 2) 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무하십시오.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)유한양행

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피홈아웃도어에어로솔(디에틸톨루아미드)(레몬향,감귤향,피톤치드향)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라둔다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약의 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기 부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말에 처치한 경우 다시 입기 전

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피홈아웃도어롤온(이카리딘)	
효능·효과	(액제) 모기, 털진드기의 기피제	(액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1. 모기 기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 바른다. 2. 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)지에스켐

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	유한아웃도어에어로솔(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라둔다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약의 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기 부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	오프에어로졸(디에틸툴루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	12세 이상~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈즈방충선언에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	12세 이상~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피홈아웃도어미스트파워(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소찬진드기)의 기피	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기포함)의 기피
용법·용량	1. 모기기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2. 진드기 기피제로 사용 시 진드기가 달라붙기 쉬운 옷, 섬유, 신발, 가방, 돗자리 등에 적당량을 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법용량에 따라 사용하십시오. 2.작은소참진드기 기피효려릉 링체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피 효과는 제한적이므로 별도의 예방수칙을 준수하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사요을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌주 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 4. 기타 이 약의 사용 시 주의 사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 가료 등에는 사용하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 이으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것,	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피홈아웃도어미스트(이카리딘)(후르츠향, 알로에향, 감귤향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1. 모기기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2. 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것. 1) 피부, 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주이 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈싹스리펠란트에어로솔(이카리딘)	
효능·효과	(에어로솔제) 털진드기의 기피	(에어로솔제) 털진드기의 기피
용법·용량	피복에 똑바로 세워 고루 분사한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법, 용량에 따를 것 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 육아실 및 영유아가 있는 방, 환자나 노인들이 있는 곳에서는 사용하지 말 것 4. 분사지역에 수족관을 두지 말 것 5. 직사광선이나 50℃ 이상에 노출시키지 말 것 6. 인화성이 있으므로 화기 가까이에 두거나 사용하지 말 것 7. 자동에어로솔 분무장치는 음식물이 노출된 곳, 음식물 조리실 혹은 주방기기에서 3.7미터 이상 떨어져서 사용할 것 8. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 9. 빈 용기일지라도 구멍을 뚫거나 태우지 말 것 10. 고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험함으로 다음의 주의를 지키십시오. 1) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 2) 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것 3) 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것 4) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	5) 불속에 버리지 말 것 6) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것 7) 밀폐된 장소에 보관하지 말 것	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)지엘제약

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워진드기유제(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워크로스스킨스프레이액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워모기캠핑겔(디에틸톨루아미드)(무향,피톤치드향,후라그란스향)	
효능·효과	(겔제) 모기, 쇠파리의 기피제	(겔제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상~2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	파워모스진가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워마이바디에어로솔(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워바디프로텍션스마트에어로솔(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분무 한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈파워바디가드스킨스프레이액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1)주의사항 1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)크린피스

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	리펠라인(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모두가라액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)팜바이오텍

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	피크닉에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	에스파워킬안심기피스프레이액(이카리딘)(무향,피톤치드향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)팜클

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	잡스에프엑스마일드가드(시트로넬라,칵테일향)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	피부에 사용시는 20㎝ 가량 거리를 두고 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부분 에 분무하고 신발, 양말, 의류에도 같은 방법으로 사용하며 모기장 주변에는 적당량을 사용한다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	잡스에프엑스내추럴가드에어로솔	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라둔다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		<고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)퍼슨

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기싹리펠란트에어로솔(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분무 한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■(주)한성바이오켐

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	이카큐액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■[주]휴인

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	휴인리펠(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	휴인안틱액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■석화제약

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	닥그린액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	① 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. ② 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. ③ 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다 (단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). ④ 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1) 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2) 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 ① 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. ② 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). ③ 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3) 기타 이 약의 사용 시 주의사항 ① 이 약은 외용으로만 사용한다. ② 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. ③ 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. ④ 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. ⑤ 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. ⑥ 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. ⑦ 속옷에는 사용하지 않는다. ⑧ 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. ⑨ 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유 (나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. ⑩ 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. ⑪ 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. ⑫ 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ⑬ 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. ⑭ 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. ⑮ 불 속에 버리지 말 것. ⑯ 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4) 저장상의 주의사항 ① 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. ② 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. ③ 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	아미그린액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다 (단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유 (나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 14) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 15) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 16) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■성인제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	아이알비젠프록스원액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기 및 진드기(작은소참진드기)의 기피	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기)의 기피
용법·용량	1. 모기기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2. 진드기기피제로서 진드기가 달라붙기 쉬운 섬유, 신발, 가방, 돗자리 등에 적당량(3-4회) 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법,용량에 따라 사용하십시오. 2. 작은소참진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피 효과는 제한적이므로 별도의 예방수칙을 준수하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 4. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 2) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장기간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 이약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고 발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	피카리딘파워액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■성진제약주식회사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	더존킬라 모스팜액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. (단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	더존킬라 모스팜 골드 액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. (단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■신신제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키드로션	
효능·효과	(로션제) 모기, 쇠파리의 기피제	(로션제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키토밀크	
효능·효과	(액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	리페란키드로션(파라멘탄-3,8-디올)	
효능·효과	(로션제) 모기, 파리, 진드기의 기피제	(로션제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 효과적인 사용을 위하여 얼굴과 목 등 노출된 모든 부위에 도포하여주세요. - 눈과 입주위에는 사용하지 않도록 하며 소아의 손에는 사용하지 않도록 하여주세요. - 지속적인 효과를 위하여 2시간 간격으로 재사용하며, 수영 후 또는 땀을 흘렸거나 과격한 운동 후, 수건으로 닦아낸 후에는 재사용하여야 합니다	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 적용상의 주의사항 1) 3세 이하의 어린이에게는 사용하지 말아주세요. 2) 눈에 자극을 줄 수 있으므로 접촉을 피해주세요. 3) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척합니다. 콘텍트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 계속해서 세척합니다. 진찰이 필요한 경우 의사와 상담하여주세요. 4) 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 하며 의사의 특별한 지시가 없는 경우, 구 토를 유도하지 말고 물 한잔을 조금씩 마시도록 합니다. 5) 소아에 적용 시는 주의를 요하며 소아가 직접 사용하지 않도록 하여주세요. 6) 화상이나 상처 난 부위에 과도한 사용을 하지 말아주세요. 7) 외용으로만 사용하여주세요. 8) 사용 후 비누와 물로 손을 씻습니다. 2. 일반적인 주의사항 1) 건조하고 서늘하며 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여주세요. 2) 사용 후 빈 용기는 폐기하여주세요.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 3세 이하의 소아 4. 이 제품을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것 1) 눈에 일시적이나 상당한 손상을 줄 수 있으므로 눈에 접촉을 피할 것. 5. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 6. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 덜어 바르고, 눈이나 입 주위를 피하고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 12) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 7. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키토액(이카리딘)(민트향, 그린티향, 골드파인향, 라벤더향, 피톤치드향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기기피제로 사용시 팔, 다리, 모덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■아성제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	가디언키파액(디에틸톨루아미드)(무향,레몬향,유칼립투스향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	수호신헌터액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	수호천사액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■에버레이드주식회사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	캐릭터모기스프레이(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말것 : 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또느 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기디펜스액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1허ㅣ 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용.) 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말것 : 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또느 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	프라임모기로션(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(로션제) 모기, 쇠파리의 기피제	(로션제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1허ㅣ 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용.) 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말것 : 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피썸머타임패밀리액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1허ㅣ 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용.) 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말것 : 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또느 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	해피썸머타임액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	나투어킬버그클리어액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스제로겔(이카리딘)	
효능·효과	(겔제) 모기, 털진드기의 기피	(겔제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 바른다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 이용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옥에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■에스씨존슨코리아(유)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	오프미스트키즈(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안 됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	오프플러스로션(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(로션제) 모기의 기피제	(로션제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	오프보테니칼로션(파라멘탄-3,8-디올)	
효능·효과	(로션제) 모기, 파리, 진드기의 기피제	(로션제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 효과적 사용을 위하여 얼굴과 목등 노출된 모든 부위에 도포한다. - 눈과 입주위에는 사용하지 않도록 하며 소아의 손에는 사용하지 않도록 한다. - 지속적인 효과를 위하여 2시간 간격으로 재사용하며, 수영후 또는 땀을 흘렸거나 과격한 운동 후, 수건으로 닦아낸 후에는 재사용하여야 한다	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 적용상의 주의사항 1) 3세 이하의 어린이에게는 사용하지 말 것. 2) 눈에 자극을 줄 수 있으므로 접촉을 피할 것. 3) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척한다. 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 계속해서 세척한다. 진찰이 필요한 경우 의사와 상담할 것. 4) 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 하며 의사의 특별한 지시가 없는 경우, 구토를 유도하지 말고 물 한잔을 조금씩 마시도록 할 것. 5) 소아에 적용 시는 주의를 요하며 소아가 직접 사용하지 않도록 할 것. 6) 화상이나 상처 난 부위에 과도한 사용을 하지 말 것. 7) 외용으로만 사용할 것. 8) 사용 후 비누와 물로 손을 씻을 것. 2. 일반적 주의사항 1) 건조하고 서늘하며 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 사용 후 빈 용기는 폐기할 것.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 3세 이하의 소아 4. 이 제품을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것 1) 눈에 일시적이나 상당한 손상을 줄 수 있으므로 눈에 접촉을 피할 것. 5. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 6. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 덜어 바르고, 눈이나 입 주위를 피하고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 12) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 7. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■엠케이제약

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디에이벅스제로액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■얼드켐

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스넷프로액(디에틸톨루아미드)(무향,시트로넬라향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기 포함) 기피	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기 포함)의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스넷썸머액(디에틸톨루아미드)(무향,민트향)	
효능·효과	(액제) 모기기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스넷프로(이카리딘)(민트향, 그린티향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무함다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■일명제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디펜스캅(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디펜스존에스에어로솔(디에틸톨루아미드)(무향,레몬향)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음).

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		<고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	아웃키퍼파워액(디에틸톨루아미드)(무향,레몬향,자스민향,피톤치드향)	
효능·효과	(액제) 모기 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출 부위에 바른다	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈라이프세이프가드액(이카리딘)(무향,피톤치드향,레몬향,자스민향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사 다우

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	다우후레쉬가드에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사에코린

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	에코가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1 ~ 3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안 됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	에코세이프액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사 제너그린

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	제니모가드액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안 됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스큐디펜스액(이카리딘)(무향, 라벤다향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사 캐쳐스

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	페스트캅아이디액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사 케이앤제이씨

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스캅액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약의 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기 부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스킬(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사드보라

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디에이피카액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다, 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수 될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 ㄴ않는다, 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스, 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■주식회사 지텍

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	바디실드액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	지카딘액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다, 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수 될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 ㄴ않는다, 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스, 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■지원(G1)상사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스바이롤온(이카리딘(무향, 로즈마리향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것.(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것. 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 접촉했을 경우네는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음) 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에는 어떠한 것도 주어서는 안됨) 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 혓볕에 많이 탄 피부에는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 덜어 바르고, 눈이나 입 주위를 피하고, 귀주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용이게 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스바이액(이카리딘)(무향, 로즈마리향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것.(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것. 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음) 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에는 어떠한 것도 주어서는 안됨) 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 혓볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 덜어 바르고, 눈이나 입 주위를 피하고, 귀주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용이게 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■청진제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	청진안티버그액제(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만: 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■케이팜

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	에코넷액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만: 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	프로가드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1)주의사항 1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■코스맥스(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그디펜스액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첩부문서를 소지 할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발 생 할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어 있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그아웃액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그디펜스에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기의 기피제	(에어로솔제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~20cm 의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주 위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1 ~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(다, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첩부문서를 소지 할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발 생 할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어 있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그기피액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그아웃에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기의 기피제	(에어로솔제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~20cm 의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주 위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1 ~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(다, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첩부문서를 소지 할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발 생 할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어 있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기키퍼액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨).

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 14) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 15) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 16) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그기피에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기의 기피제	(에어로솔제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10 ~20cm 의 거리에서 팔, 다리, 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주 위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첩부문서를 소지 할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발 생 할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어 있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모기펜스에어로졸(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기, 쇠파리, 벼룩, 독충, 위생해충 등의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~ 20 cm 의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분무한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그가드겔(이카리딘)	
효능·효과	(겔제) 모기기피제	(겔제) 모기의 기피
용법·용량	- 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부위에 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 사처를 줄 수 잇다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수 될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모그가드액(이카리딘)	
효능·효과	(액제) 모기, 털진드기의 기피	(액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부위에 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■코아파마켐

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	코아가든액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	-12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세이상~12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출 부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만: 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계쏙되면 으시아ㅢ 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거 할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기 타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품을 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유나(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 도는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물리 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■태극제약(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키앤가드액(디에틸톨루아미드)(라벤더향,무향)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	-적당량을 피부 노출부위에 바름	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음 환자(부위)에는 사용하지 말 것. 1) 신속히 흡수할 수 있는 피부부위(큰상처, 관절부위, 점막, 눈주위 등)에는 사용하지 않는다. 2) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고 체표면의 20%이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 3) 화기에 주의한다. 4) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다. 5) 안경테와 화학섬유 등과 같은 플라스틱 제품과의 접촉을 피한다. 6) 마시거나 삼키지 않는다. 2. 금기 유아에게는 사용을 금한다. 3. 부작용 피부발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생 할 수 있다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모스키앤그린액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피	(액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1 ~ 3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■피씨오텍

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	가드벅기피제(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	포스트가드액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손사을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■한국디비케이(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	킬파프모기안녕(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만: 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	매직기피제유제(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~12세미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월이상 ~2세미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(다, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사랑ㅁ은 이 약을 사용하지 말 것. 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 중방기기, 소아의 장난감, 동물리 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	킬파프어웨이에어졸(디에틸톨루아미드)(시트로넬라향,아쿠아향,바나나향,칵테일향)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기의 기피
용법·용량	- 12세 이상~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라 준다. - 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리, 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	매직기피제에어로솔(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기의 기피제	(에어로솔제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라 준다. - 6개월 이상 ~2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다. (소아에게 직접 사용하지 말 것)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출주위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	킬파프어웨이유제(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것. 12세 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	킬파프모기안녕기피제로션(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(로션제) 모기의 기피제	(로션제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	나투어킬버그오프유제(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고 체표면의 20%(대략 양쪽팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	매직진드기기피액제(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 진드기(작은소참진드기)의 기피	(분무형 액제) 진드기(작은소참진드기 포함)의 기피
용법·용량	진드기가 달라붙기 쉬운 섬유, 신발, 가방, 돗자리 등에 적당량(3~4회) 분무한다.	약 10～20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입 주위 제외) 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복들에 적당량을 분사한다,
사용상의 주의사항	1. 용법·용량에 따라 사용하십시오. 2. 작은소참진드기의 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피효과는 제한적이므로 별도의 예방수칙을 준수하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의가의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 4. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 신속히 흡수될수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 2) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 3) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 4) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 5) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	는다. 6) 속옷에는 사용하지 않는다. 7) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 8) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	매직털진드기기피제에어로솔(이카리딘)	
효능·효과	(에어로솔제) 털진드기기피제	(에어로솔제) 털진드기의 기피
용법·용량	피복에 똑바로 세워 고루 분사한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법·용량에 따를 것. 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 육아실 영유아가 있는 방, 환자나 노인들이 있는 곳에서는 사용하지 말 것. 4. 분사지역에 수족관을 두지 말 것. 5. 직사광선이나 50℃ 이상에 노출시키지 말 것. 6. 인화성이 있으므로 화기 가까이에 두거나 사용하지 말 것. 7. 자동에어로솔 분무장치는 음식물이 노출된 곳, 음식물 조리실 혹은 주방기기에서 3.7미터 이상 떨어져서 사용할 것. 8. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 9. 빈 용기일지라도 구멍을 뚫거나 태우지 말 것. 10. 고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험함으로 다음 사항에 주의하십시오. 1) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 2) 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. 3) 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. 4) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	를 실시할 것. 5) 불속에 버리지 말 것. 6) 사용 후 잔가스가 없도록 하여 버릴 것. 7) 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■한국삼공(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	인섹트아웃액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) 4. 6개월 미만: 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	에스지플러스리펠런트아로마미스트액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털 진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털 진드기 기피제로 사용 시 피복에 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 치 첨부 문서를 소지할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고, 물로 충분히 씻고, 필요하면 의사의 진찰을 받을 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있으며, 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것.(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사요이 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹이거나, 껌을 씹거나, 담배를 피우거나, 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱 안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스틱, 손목시계의 류리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관 할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고 발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■한국콜마(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	벅스워리어미스트액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1. 모기 기피제로 사용 시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2. 털진드기 기피제로 사용 시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■한세약품

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모티안티모가드(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20 cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	모티안티모가드플러스액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	- 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 2세 이상 ~ 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	온가족모기진드기리펠액(이카리딘)(무향, 레몬향, 라벤다향, 페파민트향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■헨켈홈케어코리아(유)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파퓨어미스트(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기포함) 기피제	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기 포함)의 기피
용법·용량	1) 모기기피시 - 12세이상 ~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때에는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월이상~2세미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월미만: 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것) 2) 작은소참진드기 기피시 - 작은소참진드기가 달라붙기 쉬운, 섬유, 신발, 가방, 돛자리 등에 적당량 분무한다(효력시간 : 45분)	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 용법 용량에 따라 사용하십시오 2. 작은소참진드기에 대한 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피효과는 제한적으로 기본적인 작은소참진드기에 대한 예방수칙을 준수하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	눈에 들어갔을 경우에는 15 ~ 20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파에스에어졸(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(에어로솔제) 모기, 진드기(작은소참진드기포함) 기피제	(에어로솔제) 모기, 진드기(작은소참진드기 포함)의 기피
용법·용량	1) 모기기피시 - 12세이상 ~성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때에는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 2세 이상 ~12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월이상~2세미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월미만: 사용하지 않는다. * 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.(소아에게 직접 사용하지 말 것) 2) 작은소참진드기 기피시 - 작은소참진드기가 달라붙기 쉬운, 섬유, 신발, 가방, 돛자리 등에 적당량 분무한다(효력시간 : 45분)	만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다.
사용상의 주의사항	1. 용법 용량에 따라 사용하십시오. 2. 작은소참진드기에 대한 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피효과는 제한적이므로 작은소참진드기에 대한 예방수칙을 준수하여 사용하십시요. 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것.	을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. <고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것> ① 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. ② 난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것. ③ 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것. ④ 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것. ⑤ 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것. ⑥ 불 속에 버리지 말 것. ⑦ 사용 후 잔 가스가 없도록 버릴 것. ⑧ 밀폐된 장소에 보관하지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파겔(이카리딘)	
효능·효과	(겔제) 모기 기피제	(겔제) 모기의 기피
용법·용량	사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 부위에 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출 부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옥과 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파롤온(이카리딘)	
효능·효과	(액제) 모기, 털진드기의 기피	(액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 바른다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 바른다.	적당량을 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 바른다.
사용상의 주의사항	1) 주의사항 1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파엑스트라롤온(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받으 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 숭 lTek. 눈에 들억ㅆ을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거ㅎf 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수돌 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손녹시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것,	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	홈키파마이키파엑스트라미스트액(디에틸톨루아미드)	
효능·효과	(액제) 모기의 기피제	(액제) 모기의 기피
용법·용량	12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.	만 12세 이상 ~ 성인 : 적당량을 얼굴(눈과 입 주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위에 바른다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 12세 미만의 소아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받으 것. 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 숭 lTek. 눈에 들억ㅆ을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거ㅎf 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 3. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수돌 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 만 12세 미만의 소아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손녹시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것,	4) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 5) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 6) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 7) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 8) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 9) 속옷에는 사용하지 않는다. 10) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 11) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 12) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 13) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■헬킨바이오

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디펜스벅스레몬향액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다, 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	디펜스벅스더블레몬향액(이카리딘)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기)의 기피	(분무형 액제) 모기, 진드기(작은소참진드기 포함)의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로서 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 진드기 기피제로서 사용시 진드기가 달라붙기 쉬운 섬유, 신발, 가방, 돗자리 등에 적당량(3-4회) 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 용법·용량에 따라 사용하십시오. 2. 작은소참진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이며, 본 제품의 작은소참진드기에 대한 기피 효과는 제한적이므로 별도의 예방수칙을 준수하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15～20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것). 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 4. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 의약외품은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 사람은 신중히 사용할 것. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20 %(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 진드기(작은소참 및 털) 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 5. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고 발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■현대약품(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	버물이카리딘케어액(이카리딘)(무향,자스민향,피톤치드향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기 기피제	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1. 모기 기피제로 사용시 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2. 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 약의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다.	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이 약 오용에 의한 사고발생이나 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다, 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

■히트러너(주)

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	페스트프리액(디에칠톨루아미드)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 쇠파리의 기피제	(분무형 액제) 모기의 기피
용법·용량	1. 12세 이상 ~ 성인: 약 10 ~ 20cm의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. 2. 2세 이상 ~ 12세 미만: 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. 3. 6개월 이상 ~ 2세 미만: 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다(단, 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용). 4. 6개월 미만: 사용하지 않는다. ※ 소아에게 사용할 때는 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다(소아에게 직접 사용하지 말 것).	- 만 12세 이상 ~ 성인 : 약 10~20㎝의 거리에서 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다. 얼굴(눈과 입주위 제외)과 목에 바를 때는 손바닥에 적당량을 덜어서 바른다. - 만 2세 이상 ~ 만 12세 미만 : 1일 1~3회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다. - 6개월 이상 ~ 만 2세 미만 : 1일 1회 소량을 얼굴과 손을 제외한 노출부위에 발라준다.(단 벌레에 물려 감염될 우려가 매우 높은 상황에서만 사용) - 6개월 미만 : 사용하지 않는다. ※ 소아(만 12세 미만)에게 사용할 때는 소아가 직접 사용하지 말고 어른 손에 먼저 취한 후 소아에게 발라준다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것 6개월 미만의 유아 2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15~20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용시 콘택트렌즈를 제거할 것) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것 3. 기타 이 약의 사용시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 3. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	위, 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 약이 도포된 손을 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 속옷에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 11) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁할 것. 12) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 13) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 14) 처리 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염 근처에 가지 말 것. 15) 불 속에 버리지 말 것. 16) 사용 후 잔 가스가 없도록 하여 버릴 것. 4. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 4. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
		말 것 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것 5. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
품목명	페스트가드액(이카리딘)(무향, 자스민향, 피톤치드향)	
효능·효과	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피	(분무형 액제) 모기, 털진드기의 기피
용법·용량	1) 모기 기피제로 사용시, 팔, 다리, 목덜미 등 노출된 피부에 적당량을 분무한다. 2) 털진드기 기피제로 사용시 피복에 똑바로 세워 고루 분무한다.	약 10~20cm의 거리에서 얼굴(눈과 입주위 제외), 목, 팔, 다리 등 노출부위 및 신발, 양말, 의복 등에 적당량을 분사한다.
사용상의 주의사항	1. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지 할 것. 1) 피부 발적을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있다. 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 들어갔을 때에는 상처를 줄 수 있다. 눈에 들어갔을 경우에는 15-20분간 물로 충분히 씻고 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(콘택트렌즈 착용 시 콘택트렌즈를 제거할 것.) 3) 먹었을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 할 것. 2. 기타 이 액의 사용 시 주의사항 1) 이 약은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부부위(상처나 염증부위, 관절부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출부위(팔, 다리, 목 등)외에 전신도포는 피하고, 체표면의 20%(대략 양쪽 팔의 표면)이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 필요이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다. 5) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 6) 외출에서 돌아오면 피부를 비누와 물로 씻는다. 7) 겉옷과 속옥에는 사용하지 않는다. 8) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 9) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 이), 플라	1. 본 제품의 용법·용량 및 사용상의 주의사항에 따라 사용할 것 2. 털진드기 기피효력은 인체가 아닌 섬유에 적용하여 확인한 것이므로, 노출부위를 최소화하여 사용하십시오. 3. 다음과 같은 사람은 이 제품을 사용하지 말 것 6개월 미만의 영아 4. 다음과 같은 경우 이 제품의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 피부가 충혈되어 붉어지는 증상을 포함하는 알레르기 반응과 과민증이 발생할 수 있어, 이 경우에는 사용을 중지하고 물로 충분히 씻고 필요하면 의사의 진찰을 받을 것 2) 눈에 접촉했을 경우에는 눈을 뜨고 15-20분간 물로 충분히 세척하고, 콘택트렌즈를 착용한 경우에는 5분간 세척 후 렌즈를 빼고 세척 후에도 자극이 계속되면 의사의 진찰을 받을 것(눈에 들어갔을 때 상처를 줄 수 있음). 3) 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받아 의사의 지시를 따를 것. 즉시 의사의 진찰을 받지 못하는 경우에는 구토를 유도하지 말고 물을 조금씩 마시게 할 것(단, 의식이 없는 환자에게는 어떠한 것도 주어서는 안됨). 5. 기타 이 제품의 사용 시 주의사항 1) 이 제품은 외용으로만 사용한다. 2) 신속히 흡수될 수 있는 피부 부위(상처나 염증 부위, 관절 부위, 점막, 눈 주위, 입 주위 등) 및 햇볕에 많이 탄 피부에는 사용하지 않는다. 3) 노출 부위(팔, 다리, 목 등) 외에 전신에 적용하는 것을 피하고, 체표면의 20%(대략 양

구 분	기 허 가 내 용	재 평 가 내 용
	스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 10) 음식물, 주방기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 3. 저장상의 주의사항 1) 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 이 약을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 이약 오용에 의한 사고발생이라 이 약의 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.	쪽 팔의 표면) 이상 과도하게 적용하지 않도록 한다. 4) 얼굴에 직접 분사하지 않는다. 5) 얼굴에 바를 경우 손에 먼저 덜어 눈이나 입 주위를 피하여 바르고, 귀 주변에는 소량만 바른다. 6) 어린이에게 바를 경우 주의를 요하며 어린이 손에 덜어주지 말고 어른 손에 덜어서 발라준다. 7) 필요 이상으로 과량 또는 장시간 사용하지 않는다(4~5시간의 기피효과가 있으므로 4시간이내에서는 추가로 사용하지 말 것). 8) 음식물 또는 음료를 먹거나 껌을 씹거나 담배를 피우거나 화장실에 가기 전에 이 제품이 도포된 손을 씻는다. 9) 외출에서 돌아오면 이 제품이 묻어있는 피부를 비누와 물로 씻는다. 10) 속옷에는 사용하지 않는다. 11) 밀폐된 장소에서는 사용하지 않는다. 12) 플라스틱안경테, 아세테이트, 레이온, 스판텍스 또는 다른 합성섬유(나일론 외), 플라스틱, 손목시계의 유리, 고무, 자동차, 페인트 또는 니스 칠한 표면에 손상을 줄 수 있다. 13) 음식물, 주방 기기, 소아의 장난감, 동물의 사료 등에는 사용하지 않는다. 14) 옷이나 양말 등에 처치한 경우 다시 입기 전에 반드시 세탁한다. 15) 불꽃을 향하여 사용하지 말 것. 16) 난로, 풍로 등 화기부근에서는 사용하지 말 것. 17) 제품을 바른 표면이 마를 때까지 불꽃이나 화염근처에 가지 말 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 이 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약외품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약외품 오용에 의한 사고발생이나 의약외품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.